

## ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

**Bepanthen 50 mg/g maść**

*Dexpanthenolum*

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.** Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Bepanthen ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Bepanthen i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bepanthen
3. Jak stosować lek Bepanthen
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Bepanthen
6. Inne informacje

### **I. CO TO JEST LEK BEPANTHEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE**

Lek Bepanthen w postaci maści zawiera substancję czynną dekspantenol. Dekspantenol po zastosowaniu miejscowym na skórę, przenika do skóry i szybko przekształca się w pantenol, który odgrywa ważną rolę w procesie wzrostu i w regeneracji skóry.

#### **Wskazania**

Ze względu na stymulowanie procesów gojenia skóry oraz odpowiedni skład podłoża, lek Bepanthen jest zalecany do leczenia oparzeń u niemowląt oraz do leczenia podrażnień brodawek sutkowych u matek karmiących piersią.

Lek Bepanthen jest również polecany:

- do codziennej pielęgnacji niemowląt (stosowanie po każdej zmianie pieluszki zapobiega powstawaniu oparzeń),
- do codziennej pielęgnacji brodawek sutkowych u matek karmiących piersią (zapobieganie powstawaniu podrażnień),
- zapobiegawczo i leczniczo przy otarciach i pęknięciach skóry.

## **2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BEPANTHEN**

### **Kiedy nie stosować leku Bepanthen**

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną dekspantenol lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

### **Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bepanthen**

Należy unikać kontaktu leku z oczami. Nie należy stosować leku Bepanthen na duże głębokie i wyraźnie zakażone rany. W takich przypadkach pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

### **Stosowanie leku Bepanthen z innymi lekami**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Bepanthen może być stosowany w okresie ciąży tylko po zaleceniu przez lekarza.

W przypadku stosowania leku u kobiet karmiących piersią, należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią

### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Nie ma wpływu na zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

### **Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bepanthen**

Ze względu na zawartość alkoholu stearylowego i lanoliny, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

## **3. JAK STOSOWAĆ LEK BEPANTHEN**

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się jak opisano poniżej.

W pielęgnacji niemowląt, aby zapobiegać odparzeniom należy nakładać lek Bepanthen przy każdej zmianie pieluszki, po wcześniejszym przemyciu wodą miejsc narażonych na odparzenia. Tak samo należy postępować w przypadku leczenia odparzeń od pieluszek.

W pielęgnacji i leczeniu brodawek sutkowych matek karmiących piersią, należy nakładać lek Bepanthen na brodawki po każdym karmieniu piersią, przy czym należy umyć brodawki przed każdym karmieniem piersią.

W przypadku otarć i pęknięć skóry należy nakładać lek Bepanthen raz lub kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb.

### **Pominięcie zastosowania leku Bepanthen**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

#### **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, lek Bepanthen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, w tym alergiczne reakcje skórne, jak zapalenie kontaktowe skóry, zapalenie alergiczne skóry, świąd, rumień, wyprysk, wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherzyki na skórze w miejscu podania.

W przypadku wystąpienia tych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

#### **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BEPANTHEN**

Bepanthen należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po każdym użyciu tubę należy starannie zakręcić.

Nie stosować leku Bepanthen po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### **6. INNE INFORMACJE**

##### **Co zawiera lek Bepanthen**

- Substancją czynną leku jest dekspantenol.

1 gram maści zawiera 50 mg dekspantenolu.

- Inne składniki leku to: protegin X, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, воск biały, lanolina, wazelina biała, olejek migdałowy, parafina ciekła, woda oczyszczona.

##### **Jak wygląda lek Bepanthen i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać maści.

Dostępne opakowania leku to tuby aluminiowe zawierające 3,5 g, 30 g, 50 g lub 100 g maści, umieszczone w tekturowym pudełku.

##### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

##### **Podmiot odpowiedzialny**

Bayer Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 158  
02-326 Warszawa

**Wytwórca**  
GP Grenzach Produktions GmbH  
Emil-Barell-Strasse 7  
79639 Grenzach-Wyhlen  
Niemcy

W razie pytań lub wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Bayer Sp. z o.o.  
Aleje Jerozolimskie 158  
02-326 Warszawa  
Numer telefonu: (0-22) 572 38 33

**Data zatwierdzenia ulotki:**

**MINISTERSTWO ZDROWIA**  
Departament Polityki Lekowej i Farmacji  
00-952 Warszawa  
ul. Miodowa 15

2008 -09- 17