

# ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
MERYTORYCZNYM

OFTIPAN, 5 mg/g, żel do oczu  
(Acidum polyacrylicum)

2008 -11- 17

**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Oftipan ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

## Spis treści:

1. Co to jest lek Oftipan i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Oftipan
3. Jak stosować lek Oftipan
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Oftipan
6. Inne informacje

## 1. CO TO JEST LEK OFTIPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Oftipan jest kwas poliakrylowy, który działa nawilżająco. Dzięki tej właściwości zapewnia prawidłowe nawilżenie powierzchni oka.

Oftipan wskazany jest w stanach zaburzonego wydzielania cieczy łzowej i zespole suchego oka.

Jedną z prawidłowych funkcji ludzkiego oka jest produkcja łez. Łzy zapobiegają wysychaniu powierzchni oka. Ciągła wymiana łez umożliwia usuwanie drobin kurzu i innych zanieczyszczeń, które znajdują się w otaczającym nas powietrzu. Łzy odgrywają bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu rogówki, której przezroczystość warunkuje prawidłowe widzenie. Zbyt mała ilość produkowanych łez prowadzi do wystąpienia zespołu suchego oka. Powstałe w wyniku tych zaburzeń objawy wynikają z nieprawidłowego nawilżenia powierzchni oka, upośledzenia odpływu łez oraz łączą się ze zwiększonym ryzykiem występowania zakażeń oka spowodowanych zmniejszonym usuwaniem ciał obcych i czynników chorobotwórczych. Zespół objawów suchego oka jest schorzeniem bardzo powszechnym. Znaczną grupę pacjentów stanowią osoby noszące soczewki kontaktowe, osoby pracujące przy komputerze a także osoby starsze, powyżej 65 lat. Grupy ryzyka stanowią też osoby z alergiami, osoby z przewlekłym zapaleniem spojówek oraz osoby przebywające w środowisku o dużym zanieczyszczeniu powietrza.

## 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU OFTIPAN

### Kiedy nie stosować leku Oftipan

Nie należy stosować leku, jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku.

### Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Oftipan

Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem żelu.

Po wkropleniu leku do oka może nastąpić przemijające pogorszenie widzenia.

MINISTERSTWO ZDROWIA  
Departament Języki Lekarskiej i Farmacji  
00-052 Warszawa  
ul. Miłkowska 15

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce należy zwrócić uwagę by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

#### **Stosowanie leku Oftipan z innymi lekami**

Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.  
Równoczesne stosowanie innych leków do oka, patrz punkt 3.

#### **Ciąża i karmienie piersią**

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn**

Stosowanie leku Oftipan może powodować wystąpienie nieostrego i (lub) nieprawidłowego widzenia. Może to wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych

### **3. JAK STOSOWAĆ LEK OFTIPAN**

Lek należy stosować zgodnie z następującymi zaleceniami:

Zakraplać po 1 kropli żelu do worka spojówkowego zwykle od 3 do 5 razy na dobę oraz przed snem. Podczas zakraplania należy tubkę trzymać pionowo nad okiem, wówczas wypływa z niej niewielka kropla, łatwo oddzielająca się od kaniuli.

Uwaga:

Podczas równoczesnego stosowania innych leków okulistycznych żel Oftipan należy podawać jako ostatni po upływie 5 minut od podania poprzedniego leku.

Po pierwszym otwarciu tuby lek powinien być stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie.

### **4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Bardzo rzadko: reakcja podrażnienia oka lub reakcje nadwrażliwości.

Brak innych danych dotyczących występowania działań niepożądanych po zastosowaniu leku.

### **5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK OFTIPAN**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu tuby lek powinien być stosowany nie dłużej niż 4 tygodnie.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

### **6. INNE INFORMACJE**

#### **Co zawiera lek Oftipan**

Substancją czynną leku jest kwas poliakrylowy.

1 g żelu zawiera 5 g kwasu poliakrylowego.

Inne składniki leku to cetrymid, sorbitol ciekły krystalizujący, disodu edetynian, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

#### **Jak wygląda lek Oftipan i co zawiera opakowanie**

Lek Oftipan to przezroczysta lub lekko opalizująca bezbarwna, jednolita masa.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g żelu umieszczona w tekturowym pudełku.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA  
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA  
58-500 Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21  
tel.: (075) 643-31-02  
fax: (075) 752-44-55  
e-mail: [jelfa@jelfa.com.pl](mailto:jelfa@jelfa.com.pl)

*Data zatwierdzenia ulotki:*

2008 -12- 10

MINISTERSTWO ZDROWIA  
Departament Główny Leków i Farmacji  
00-072 Warszawa  
ul. Miodowa 15